

・カンジダ性膣炎




図 2 KOH 標本 (×1,000)

カンジダの偽菌糸が明瞭に観察できる。これは検体採取から約1分後の標本である。




図 1-3 カンジダ症

○ 膣炎の治療

表 2 抗真菌剤ならびに抗トリコモナス剤

抗真菌剤	剤型	一般名	商品名	1錠(本)中含有量	使用法
膣錠 (坐薬)		トリコマイシン	トリコマイシン膣錠	5万U	1錠/日 10~14日間
		ピマリシン	ピマフシン膣錠	25mg	"
		クロトリマゾール	エンベシド膣錠	100mg	1錠/日 6日間
		ミコナゾール	フロリード膣坐剤	100mg	"
		硝酸エコナゾール	パラベール膣坐剤	50mg	"
		硝酸イソコナゾール	アデスタン G 100 膣錠	100mg	1錠/日 6日間
			300 膣錠	300mg	2錠1回使用
		硝酸オキシコナゾール	オキナゾール 100 膣錠	100mg	1錠/日 6日間
		600 膣錠	600mg	1錠1回使用	
外用塗布剤		ナイスタチン	マイコスタチン軟膏	10万U (1g)	1日数回塗布
		ピマリシン	ピマフシン軟膏	20mg (1g)	"
		クロトリマゾール	エンベシドクリーム	10mg (1g)	"
		ミコナゾール	フロリード D クリーム	"	"
		硝酸エコナゾール	パラベールクリーム	"	"
		硝酸イソコナゾール	アデスタンクリーム	"	"
		硝酸オキシコナゾール	オキナゾールクリーム	"	"

○ カンジダ → 膣洗(42点) + エンベシド膣錠1T(7点)

○ 細菌性膣炎 → 膣洗(42点) + クロマイ膣錠1T(9点)

○ トリコモナス → 膣洗(42点) + フラジール膣錠1丁(4点)

○ クラミジア 淋菌

膣洗(42点) + ナイスタチン膣錠(0点)