


着床とはどのようなことでしょうか



着床→絨毛形成→絨毛性ゴナドトロピン→妊娠反応陽性（受精後 2週間後）






図6 分泌期後期：分泌所見はほとんど認められず、延長した microvilli と線毛が認められる ( $\times 2400$ )。

#) 卵管 子宮内膜

## 妊娠週数と尿中HCG量




#) 尿の妊娠反応



(図 C-12-1) 妊娠 5 週 3 日の胎嚢(GS)像。


9w 4 d



(図1) 妊娠9週4日の胎児矢状断像。CRLの計測は矢状断で行うことが望ましい。

流産

胎盤娩出



進行流産(胎盤剥離)



完全流産




#) 流産

妊娠结局的异常一

子宫外妊娠(1)

输卵管妊娠



宫腔部妊娠



#) 子宫外妊娠

#) 当院での妊婦健診の流れ 緑井レディースクリニック

- 1) 初診 妊娠反応（尿） 超音波検査  
現在の妊娠週数・予定日 の確認  
連携病院、分娩病院の説明
- 2) 1週間後、超音波検査にて、確認後、  
一度夜間診療可能な病院に紹介状（併診可能かどうか）
- 3) 併診可能の場合、当科にて妊婦健診可能  
超音波検査で、胎児心拍の確認 → 母子手帳の申請  
細胞診検査（子宮頸がん検査）  
里帰り分娩では、帰省先の病院に分娩予約を  
(但し、当院で諸検査していなければ、帰省先の病院  
への当院からの紹介は無理)
- 4) 再診 超音波検査  
妊娠初期検査（母子手帳の割引券使用）
- 5) 再診 以後、約 32～33週まで、当院にて、妊婦健診