



GlaxoSmithKline 子宮頸がん、撲滅へ。



未来のあなたのために しきゅうのお知らせ




知って
ください。



子宮頸がんは
定期的な検診と
ワクチン接種で
予防できます。

子宮頸がん発症のピークは30代です。

子宮頸がんは、20～30代から急増する、女性のがんです(下図)。子宮頸がんになると、手術で子宮を失うこともあります。命は助かっても、これから赤ちゃんを産む可能性がある女性にとっては、大変に深刻な問題です。



国立がんセンターがん対策情報センター、人口動態統計(厚生労働省大臣官房統計情報部編)



女 子宮頸がん予防ワクチン 女



子宮頸がんを予防するためのワクチンがあります。
なお、子宮頸がん予防ワクチンの接種が最も効果的とされる年齢は、原因ウイルスに**まだ感染していないと考えられる、10代前半**です¹⁾。

原因はウイルス

子宮頸がんの原因は、**発がん性HPV**^{*}というウイルスの感染です。

※ヒトパピローマウイルス

ほとんどの女性が一生に一度は感染



1) 参考: 日本産科婦人科学会、日本産婦人科医会編:産婦人科診療ガイドライン 婦人科外来編2011

平成24年度(2012年度)も、子宮頸がん予防ワクチン接種は公費で助成されます。

中学1年生
↓
高校1年生
に相当する女性

対象

高校2年生に相当する女性
ただし、平成24年3月31日までに
1回目か2回目の接種を受けている場合

小学6年生に相当する女性から助成の対象としている自治体もあります。
詳しくはお住まいの自治体にご確認ください。

健発0208第3号、薬食発0208第2号 厚生労働省 健康局長、医薬食品局長連名通知[「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業の実施について」の一部改正について](平成24年2月8日)より作図



女 定期的な子宮頸がん検診 女




子宮頸がん予防ワクチンは、主要原因ウイルスHPV 16型、18型の感染を予防します(図)。

その他の**発がん性HPV**が引き起こす子宮頸がんは、ワクチンを接種しても予防できません。

こうした子宮頸がんを予防するためには、**20歳からは定期的に子宮頸がん検診を受けることが必要**です²⁾。

きちんと検診を受けて、がんになる前に異常を発見することで、子宮をとらない治療で済ませることが出来ます。



日本人子宮頸がんからみつける発がん性HPV

2) 参考: 健発第0331058号 厚生労働省健康局長通知「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針について」(平成20年3月31日)

Onuki M et al.:Cancer Sci 100(7):1312-1316, 2009より作図

子宮頸がん予防ワクチン については、 医師にご相談ください。



気になること、知りたいことは
あらかじめお医者さんに相談しましょう。



私が大人になるまで、
ワクチンの効果って
続くのかな？

検診ではみつきりにくい
子宮頸がんもあるって
聞いたけど…。



どうして
ワクチンを打ったあと、
痛むことがあるのかな？

私に合った
ワクチンを知りたいな。



子宮頸がん予防に関する情報はこちら

未来のあなた

検索

すべての女性に知ってほしい
子宮頸がん情報サイト
allwomen.jp



グラクソ・スミスクライン株式会社

〒151-8566 東京都渋谷区千駄ヶ谷 4-6-15
http://www.glaxosmithkline.co.jp