

字幕放送

解説放送(副音声)

きょうの
健康

A person wearing a blue and red outfit is walking through a dense, green forest. The scene is slightly blurred, suggesting movement. The text is overlaid on the left side of the image.

これで安心!

甲状腺の病気と妊娠

これで安心!
甲状腺の病気
と妊娠

久田直子

福家 睦







橋本病

バセドウ病





これで安心! 甲状腺機能低下症と妊娠

NHK E

甲状腺機能低下症と

橋

東京都予防医学協会 部長

百溪尚子

これで安心! 甲状腺疾患と妊娠

NHK E

機能低下と



百瀬尚子

甲状腺の病気の診断・治療
特に妊娠・出産との関わり

これで安心!甲状腺の病気と妊娠

機能低下症と
橋本病









橋本病

＝甲状腺に
一種の炎症が
起きている

甲状腺ホルモン

正常

(治療不要)

不足

＝
機能低下症

甲状腺機能低下症のサイン

- 寒さに弱くなる
- 気力・活力の低下
- 体、特に顔がむくむ
- 皮膚の乾燥
- コレステロール値が治療後も下がらない
(LDL)
- のどの部分がふくらんだ

検 査

血液検査

TSH

甲状腺刺激ホルモン



A woman with short dark hair and glasses is speaking at a podium. She is wearing a dark jacket over a patterned top. The background consists of vertical panels in shades of purple, orange, and light blue.

日本甲状腺学会

<http://thyroid.umin.ac.jp/flame.html>

甲状腺ホルモン不足の場合

◎ 流産の確率が上昇

◎ 生理不順

(量が多い・間隔が短いなど)

⇒ 治療をすれば問題なし!

甲状腺機能低下症のくすり

甲状腺ホルモン薬

レボチロキシンナトリウム水和物
(チラーヂンS)


- ◎甲状腺ホルモンと同じ成分
- ◎足りない分だけの量をのむ(1日1回)

甲状腺機能低下症のくすり

甲状腺ホルモン薬

レボチロキシンナトリウム水和物
(チラーヂンS)

- ◎甲状腺ホルモンと同じ成分
- ◎足りない分だけの量をのむ(1日1回)




機能低下症と妊娠中の治療

- 妊娠中は必要な量が
増える場合がある

➔ 妊娠前よりのむ量を増やす



- 定期検査(血液検査)で、
甲状腺ホルモンの量を確認する

量が決めれば2か月ごとでも大丈夫



誤解をなくして
安心して出産を!



 書店にない場合は
NHK出版 0570-000-321 



これで安心!甲状腺の病気と妊娠

明日は...

バセドウ病

字幕放送

解説放送(副音声)

きょうの
健康



A lush green forest scene with a person in the background. The text is overlaid on the image.

これで安心!

甲状腺の病気と妊娠

これで安心!
甲状腺の病気
と妊娠

久田直子

福家 睦



これで安心甲状腺の病気と妊娠

甲状腺病

東京都予防医学協会 部長

百瀬尚子

バセドウ病の年齢分布

百瀬尚子調べ



これで安心!甲状腺の病気と妊娠

バセドウ病





甲状腺ホルモン

- 新陳代謝を活発にする
- 心身を元気にさせる



下垂体

甲状腺刺激ホルモン
TSH



バセドウ病
特有の
刺激物質

甲状腺ホルモン

バセドウ病と妊娠・出産

甲状腺ホルモンが高い間

◎ 流産・早産が
通常より多くなる

➡ 甲状腺ホルモン濃度が
正常になれば、
安全に妊娠・出産可能

バセドウ病のサイン

●首がふくらんでみえる

●暑さに弱くなる

●どろきや息切れがする

●手がふるえる

●体重が減る

検 査

血液検査

TSH

甲状腺刺激ホルモン





日本甲状腺学会

<http://thyroid.umin.ac.jp/flame.html>

バセドウ病の治療法

抗甲状腺薬

アイソトープ治療

放射性ヨード

手術

バセドウ病のくすり

抗甲状腺薬



✓チアマゾール (メルカゾール)

●プロピルチオウラシル
(チウラジール・プロバジール)

nhkE



放射性ヨード

バセドウ病 アイソープ治療と妊娠・出産

放射性ヨードが入った
カプセルを服用

◎子どもへの影響なし

◎不妊となることはない

治療後4か月間は妊娠を控える

バセドウ病 出産後について

産後1年間に通院を (再発・症状悪化の早期発見)

🕒 1~3か月に1回ほど

授乳は基本的に可能

どちらの薬も安全に授乳できる量がある



きょうの健康

ここが聞きたい! 名医にQ

ご質問・ご相談をお寄せ下さい


質問FAX

03-5454-9001

ホームページ

www.nhk.or.jp/kenko/



 書店にない場合は
NHK出版 0570-000-321



きょうの

健康



Q&A

これで安心!

甲状腺の病気と妊娠

不足

機能低下症
橋本病など


過剰

機能亢進症
バセドウ病など



甲状腺ホルモン

- 新陳代謝を活発にする
- 心身を元気にさせる



耳鼻咽喉科と
7日の放送下
で、自分も服用
-年ずーと
が「うしく不願

城島 主婦

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

お名前: 本人

女性は 30歳
福岡県在住

きょうの健康

「Q&A これで安心! 甲状腺の病気と女性妊娠」御中

1/20-27の番組、大変興味深く拝見致しました。

私は、前日第一子を出産し、昨年第二子の妊娠を
経験し、甲状腺の病気と妊娠の関係について
大変興味をもちました。

番組では「甲状腺の病気」という見出し
で、甲状腺の病気と妊娠の関係について
詳しく説明されていました。




甲状腺の病気
甲状腺の病気
甲状腺の病気

甲状腺

子供(小1)
ふくんで、は
Eコ-受





橋本病の人は妊娠しにくい？



橋本病

＝甲状腺に
一種の炎症が
起きている


甲状腺ホルモン

正常

(治療不要)

不足

Ⅱ
機能低下症



機能低下症で服薬中
治療しないと胎児の知能低下?



Q
第一子妊娠中にバセドウ病 以来
服薬中 次の妊娠時も服薬必要?

バセドウ病のくすり

抗甲状腺薬

①チアマゾール (メルカゾール)

②プロピルチオウラシル
(チウラジール・プロバジール)






パセドウ病で出産 子どもの低下症は
遺伝？ 服薬は成長に影響？



Q

子どもが先天性甲状腺機能低下症
服薬中 副作用や発達の遅れは？



Q
去年10月から治療開始 数値が
安定するまで避妊とはいつまで？

バセドウ病の治療法




抗甲状腺薬

アイソトープ治療

放射性ヨード

手術



妊娠37週 パセドウ病で服薬中
母乳育児はできる？

